

POTÊNCIA

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \dots a$$

$$a^n = X$$

a: base da potenciação (número que está sendo multiplicado por ele mesmo);
n: expoente (número de vezes que a base está sendo multiplicada). **X:** potência.



Regras de potenciação:

1. $a^0 = 1$	→ Seja qual for o número elevado a zero, o seu resultado é sempre 1.
2. $a^1 = a$	→ Todo e qualquer número elevado a 1, o seu resultado é o próprio número.
3. $a^{-k} = \left(\frac{1}{a}\right)^k$	→ Potência de expoente negativo: quando expoente for negativo, o seu resultado é o inverso da base levantando o expoente, desta vez, positivo.
4. $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$	→ Multiplicação de potência (= base): multiplicando potências co a mesma base, mantém-se a base e somam-se os expoentes.
5. $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	→ Multiplicação de potências (\neq base): multiplicando potências com bases diferentes, mantém-se o expoente e multiplicam-se as bases.
6. $a^n : a^m = a^{n-m}$	→ Divisão de potências (= base): na divisão de potências com mesma base, mantém a base e subtraem os expoentes.
7. $a^n : b^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n$	→ Divisão de potências (\neq base): divisão de potências com bases diferentes, mantém-se o expoente e dividem-se as bases.
8. $(a^n)^p = a^{n \cdot p}$	→ Potência de uma potência: na potência de uma potência, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes.
9. $a^{\frac{p}{n}} = \sqrt[n]{a^p}$	→ Potência de expoente fracionário: quando o expoente de uma potência é uma fração, resulta numa raiz cujo índice é o denominador da fração.

n, m e p = expoentes

a e b = constantes (bases)

RAÍZES

$$\sqrt[n]{a} = X$$

n: Índice;**a**: radicando; $\sqrt{}$: radical;**X**: raiz.**Regras de radiciação:**

1. $(\sqrt[n]{a})^n = a$	→ Potência de uma raiz: quando o índice da potência apresenta o mesmo índice de raiz, ambos anulam-se.
2. $(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p}$	→ Raiz de uma potência e potência de uma raiz: quando uma raiz é a base de uma potência $(\sqrt[n]{a})^p$, o índice do radicando $\sqrt[n]{a^p}$.
3. $\sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[n \cdot p]{a}$	→ Raiz de uma raiz: quando uma raiz é raiz ou radicando de outra raiz, multiplicam-se os seu índices.
4. $\sqrt[n]{a \cdot b \cdot c} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$	→ Multiplicação de raízes <u>com o mesmo índice</u> : quando uma raiz ou radicando de outra raiz: $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c} = \sqrt[n]{a \cdot b \cdot c}$
5. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	→ Divisão de raízes com o mesmo índice: a divisão de raízes com o mesmo índice resulta numa só raiz de índice n, onde a divisão é efetuada pelos seus radicandos: $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
a · $\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$ \Leftrightarrow $\sqrt[n]{a^n \cdot b} = a \cdot \sqrt[n]{b}$	→ O produto entre um número real positivo a e uma raiz é igual a raiz do produto destes dois números, onde a ao ser transferido para o interior da raiz é afetado pelo seu índice, e vice versa.
6. $a^{-\frac{p}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^p}}$	→ Potência de expoente fracionário negativo: quando o expoente de uma potência é uma fração negativa; resulta numa fração cujo o denominador é uma raiz em que n será o índice e p o expoente do radicando.

LISTA DE EXERCÍCIOS- POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO

1- Calcule o valor das potências abaixo, utilizando sempre que possível as propriedades das potências estudadas.

a) $(8^{58} \cdot 8^{-41}) : 8^{17} =$

b) $\frac{(-11)^{-8}}{(-11)^{-7}} =$

c) $\frac{15^5 \cdot (15^5)^{-4}}{15^{-8} \cdot 15^{-9}} =$



d) $\frac{2^{10} \cdot 3^2 \cdot 5^4}{200 \cdot 400 \cdot 36} =$

2- Qual o valor da expressão $\sqrt{5 + \sqrt{5}} \cdot \sqrt{5 - \sqrt{5}}$?

3- Simplifique o máximo possível a expressão $\sqrt[5]{\frac{3^{17} - 3^{16}}{6}}$

.

4- Calcule a área, o perímetro e a diagonal de cada retângulo abaixo. Simplifique o máximo possível o resultado.



5- Efetue as operações com radicais, simplificando o resultado sempre que possível.

a) $125^{\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{-64} + 216^{\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{-27} =$

b) $\sqrt{361} + \sqrt{225} - 144^{\frac{1}{2}} =$

c) $\sqrt[3]{56} - 32^{\frac{1}{3}} + \sqrt[3]{108} - \sqrt[3]{7^7} =$

6- Simplifique o máximo possível os radicais abaixo.

$$a) \sqrt[4]{7^a} \cdot \sqrt[4]{2^7} \cdot \sqrt[4]{14} =$$

$$b) \frac{\sqrt{162}}{\sqrt{117}} =$$

$$c) \sqrt{(-3)^6} =$$

$$d) \sqrt[3]{196} \cdot \sqrt[3]{28} =$$

7- Sabendo que $\sqrt{a} = 8,6$, $\sqrt[4]{b} = 1,5$, $\sqrt[8]{c} = 4,3$, calcule o valor de $\sqrt[8]{\frac{a^4 \cdot b^2}{c}}$.

8- Na igualdade $\sqrt{8} + \sqrt{18} = n\sqrt{2}$, qual o valor de n?

9- Calcule o volume de um reservatório com forma de um paralelepípedo de dimensões $\sqrt{6}m$, $2\sqrt{2}m$ e $\sqrt{11}m$.

10- Construa um quadrado de lado 1 e calcule sua diagonal. Em seguida repita o processo para calcular a hipotenusa do triângulo retângulo com catetos 1 a medida da diagonal do quadrado. Quais valores encontrados. O que acontece se repetirmos esse processo mais vezes?